



# PROGRAMA AJOS Y CEBOLLA

*Allium sativum* y  
*Allium cepa*



## ESTADOS FENOLÓGICOS



SIEMBRA  
ESTABLECIMIENTO



1-2 HOJAS  
VERDADERAS



10 HOJAS VERDADERAS  
INICIO DE BULBIFICACIÓN



CRECIMIENTO  
DEL BULBO



COSECHA



BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS

300-500 cc/hl o 3-5 L/ha  
(aplicar semanal o quincenalmente)



ACTIVADOR BIOLÓGICO DE SUELOS

10 – 20 L/ha

60 – 100 L/ha  
(distribuidos semanal o  
quincenalmente)



ACEITE NATURAL DE USO AGRÍCOLA

300-1000 cc/hl

### Notas:

- Junto con las aplicaciones de insecticida aplicar Aminoterra® para evitar estrés de plantas.
- En caso de sospecha de IYSV aplicar Aminoterra® 2 -3 L/ha cada 4 días vía foliar para evitar decaimiento de plantas.
- En caso de daño en hojas por herbicida, hongos o bacterias fitopatógenas, una vez que se ha realizado el control fitosanitario y que la hoja ya está seca, aplicar Aminoterra® 2 L/ha cada 4 días vía foliar o fertirriego.
- En caso de plantas que no crecen por alta carga de químicos en el suelo realizar aplicaciones de Bioamino-L vía fertirriego de 5 - 10 L/ha semanales o quincenales, hasta completar 60 a 100 L/ha en la temporada, según diagnóstico.