



PROGRAMA AJOS Y CEBOLLAS

Allium sativum y
Allium cepa

ESTADOS FENOLÓGICOS




ESTABLECIMIENTO



1-2 HOJAS
VERDADERAS



12 HOJAS VERDADERAS,
INICIO BULBIFICACIÓN



CRECIMIENTO
DEL BULBO



COSECHA



BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS

2 - 3 L/ha
(aplicar semanal o quincenalmente, intercalando
con Bioamino-L®)



BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS

20 - 30 L/ha totales
(Distribuidos semanal o quincenalmente,
intercalando con BioaminoL ®)



ACTIVADOR BIOLÓGICO DE SUELOS

40 - 80 L/ha Totales
(distribuidos semanal o quincenalmente intercalando con Aminoterra®)

Notas:

- Junto con las aplicaciones de insecticida aplicar Aminoterra® para evitar estrés de plantas.
- Para aportes de zinc foliar, reemplazar la recomendación de Aminoterra® por Aminoterra® PLUS ZINC.
- En caso de sospecha de IYSV aplicar Aminoterra® 2 -3 L/Ha cada 4 días vía foliar para evitar decaimiento de plantas.
- En caso de daño en hojas por herbicida, hongos o bacterias fitopatógenas, una vez que se ha realizado el control fitosanitario y que la hoja ya está seca, aplicar Aminoterra® 2 L/Ha cada 4 días vía foliar o fertirriego.
- En caso de plantas que no crecen por alta carga de químicos en el suelo realizar aplicaciones de Bioamino-L vía fertirriego de 5 - 10 L/Ha semanales o quincenales, hasta completar 40 a 80 L/Ha en la temporada, según diagnóstico.