



**PROGRAMA  
CEREALES:  
TRIGO,  
AVENA,  
CEBADA Y  
TRITICALE**

**ESTADOS  
FENOLÓGICOS**



**BARBECHO  
QUÍMICO**



**SIEMBRA**



**1 Y 2 HOJA**



**MACOLLA**



**ENCAÑADO  
(1 NUDO)**



**ESPIGADURA Y  
FLORACIÓN**



**LLENADO DE  
GRANOS**



**BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS**

**Tratamiento semillas:**  
400 cc/100 kg semilla.  
En caso de bioinoculación de  
semillas, reemplazar por  
Bioamino-L® a la misma  
dosis.

**2 – 3 L/ha**  
(2 -3 aplicaciones foliares, desde inicio de macolla hasta  
encañado. Se puede aplicar junto con fitosanitarios)

**2-3 L/ha**  
(1 aplicación)



**ACTIVADOR BIOLÓGICO DE SUELOS**

**3 – 5 L/ha**  
(en pre y post emergencia del cultivo, dirigido  
al suelo. Dilución máxima al 3%)



**ACEITE NATURAL DE USO AGRÍCOLA**

**0,5 - 1%**  
(junto con herbicidas)

**Notas:**

- En caso de estrés severo de plantas aplicar Aminoterra® 5-10 L/ha vía foliar, de ser necesario repetir a los 7 días.
- Puede aplicar indistintamente Aminoterra® o Aminoterra Plus Zinc® según diagnóstico.